

Relatório Técnico nº 01/CGMA/SRMA/
SAGA/SEMA-MT/2025

Análise da Ocorrência e Distribuição dos Focos de Calor e Cicatrizes de Queima no Estado de Mato Grosso: ano de 2023

Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA-MT

Coordenadoria de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental – CGMA
Superintendência de Regularização e Monitoramento Ambiental – SRMA
Secretaria Adjunta de Gestão Ambiental – SAGA

Palácio Paiaguás, Rua C, CEP: 78.049-913 – Cuiabá – Mato Grosso

Equipe Técnica:

Olga Patricia Kummer
Analista de Meio Ambiente
Coordenadora de
Geoprocessamento e
Monitoramento Ambiental
CGMA/SRMA/SAGA/SEMA-MT

Simoni Ramalho Ziober
Analista de Meio Ambiente
CGMA/SRMA/SAGA/SEMA-MT

Relatório Técnico nº 01/CGMA/SRMA/SAGA/SEMA/2025

Responsável pela execução:

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE – SEMA

Secretária Adjunta de Gestão Ambiental – SAGA
Luciane Bertinatto Copetti

Superintendente de Regularização e Monitoramento Ambiental - SRMA
Felipe Guilherme Klein

Coordenador de Geotecnologia e Monitoramento Ambiental - CGMA
Olga Patrícia Kummer

Elaborado por:

Olga Patrícia Kummer
Simoni Ramalho Ziober

Maio de 2025

Sumário

INTRODUÇÃO.....	5
OBJETIVO	10
METODOLOGIA	11
ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DOS FOCOS DE CALOR E CICATRIZES DE QUEIMA.....	15
Distribuição dos Focos de Calor e Área queimada por Município	15
Distribuição dos Focos de Calor e Área queimada por Bioma	20
Distribuição dos Focos de Calor e Área queimada Categoria Fundiária	20
Distribuição dos Focos de Calor e Área Queimada em Terras indígenas.....	22
Distribuição dos Focos de Calor e Área Queimada em Unidades de Conservação	24
Distribuição dos Focos de Calor e Área Queimada em Projetos de Assentamento	27
Cruzamento dos dados de focos de Calor com os alertas de desmatamento e área queimada	29
Cruzamento dos dados de alertas de queimadas com os dados de vegetação nativa do Projeto MapBiomas	30
CONSIDERAÇÕES FINAIS	32
REFERÊNCIAS	35

Lista de Figuras

Figura 01 - Tipos climáticos de Mato Grosso (Köppen).....	7
Figura 2 – Focos de calor no Estado de Mato Grosso em 13/05/2025.	9
Figura 3 – Alertas de cicatrizes de queima no Estado de Mato Grosso em entre 06/04/2025 e 05/05/2025.....	10
Figura 04 - Exemplo da relação de imagens orbitais e focos de calor.	14
Figura 05 - Mapa estimador de densidade Kernel para os focos de calor de 2023.	16
Figura 06 - Mapa de densidade de focos de calor do município/100 km ² , no ano de 2023. ..	17
Figura 07 - Mapa de densidade de área queimada do município (km ²)/100 km ² , no ano de 2023.	20
Figura 08 - Mapa estimador de densidade Kernel para focos de calor de 2023 e as 10 Terras indígenas com maior número de focos naquele ano.	23
Figura 09 - Mapa estimador de densidade Kernel para focos de calor de 2023 e as 10 Unidades de Conservação com maior número de focos naquele ano.	26
Figura 10 - Mapa estimador de densidade Kernel para focos de calor de 2023 e os 10 Projetos de Assentamento da Reforma Agrária com maior número de focos naquele ano. ...	28
Figura 11. Dashboard de queimadas do programa TerraBrasilis contendo a distribuição dos focos de calor do ano de 2023, em diferentes classes de cobertura do solo, nos biomas Amazônia (a) Cerrado (b) e Pantanal (c), no estado de Mato Grosso.	32

INTRODUÇÃO

A queimada é um procedimento de manejo agropastoril, no qual se emprega o fogo para limpeza de área para cultivo ou para queima de restos de produção. Já o incêndio florestal é a ocorrência de fogo fora de controle em qualquer tipo de vegetação, muitas vezes ocasionado por queimadas que não foram devidamente autorizadas e monitoradas. Os incêndios podem ser causados tanto pela ação do homem, quanto por ações da natureza.

O uso do fogo em práticas agropecuárias está fortemente associado aos processos de desenvolvimento socioeconômico, principalmente em países subdesenvolvidos, onde não se encontram planejamentos para a ocupação do território, nem projetos e estudos para explorar de maneira sustentável os recursos da terra.

As queimadas são utilizadas tanto em sistemas de produção agropecuários primitivos ou convencionais, praticados tanto por indígenas, comunidades tradicionais e pequenos agricultores, quanto em sistemas com altos níveis de tecnicidade. (COUTINHO, 2005).

As queimadas praticadas na agricultura e pecuária têm o objetivo de promover a adubação através dos depósitos de cinza, eliminar plantas invasoras de pastagens, limpar os campos para o plantio, provocar a rebrota das gramíneas renovando as pastagens, controlar a população de carrapatos nas pastagens, combater pragas em restos de culturas e facilitar o trabalho humano como, por exemplo, na colheita manual da cana-de-açúcar, entre outros interesses. No entanto essa prática para limpeza e preparo do solo antes do plantio, pode causar danos bem maiores que vantagens, pois eliminam nutrientes essenciais às plantas, além de trazer uma série de prejuízos à biodiversidade, à dinâmica dos ecossistemas e à qualidade do ar.

Segundo Aragão (2013), as secas reduzem a produtividade florestal, aumentando a mortalidade de árvores e a perda de folhas. Estes processos levam a um aumento da abertura do dossel e, conseqüentemente, a um aumento da radiação solar incidente e das temperaturas no interior do dossel, que favorecem o rápido secamento do material orgânico acumulado sobre o solo. Portanto, florestas sujeitas a tais condições, naturalmente, tornam-se mais vulneráveis a incêndios. A probabilidade de incêndios pode ser intensificada devido à interação entre secas e degradação, incluindo efeito de borda, corte seletivo e desmatamento. Além disso, grandes áreas desmatadas e a fumaça proveniente da biomassa queimada podem causar redução na precipitação local.

Fontes de ignição antropogênica são as principais causas de incêndios, uma vez que as fontes naturais, principalmente as descargas atmosféricas, são menos frequentes e prejudiciais (GANTEAUME E SYPHARD, 2018 *apud* OLIVEIRA *et al*, 2022). Queimadas naturais no bioma Amazônico são raras, sendo estas historicamente mais comuns no bioma Cerrado. Isto se deve, principalmente, ao clima do Cerrado, que apresenta prolongada temporada de estiagem (5-7 meses) com chuvas mensais abaixo de 100 mm, produzindo condições propícias para a ocorrência de queimadas naturais. No entanto, esse padrão natural não se reflete nas

observações recentes de ocorrência de queimadas na região amazônica (ARAGÃO, 2016), evidenciando que esse aumento de focos de queimada vem sendo causado por uso antrópico.

A prática de queimadas é nociva à saúde, provocando o aumento de atendimentos de urgência em pneumologia pediátrica, elevação de casos de patologias cardiorrespiratórias, aborto espontâneo, redução do peso do recém-nascido, carcinomas, redução da fertilidade, dentre outros. Sua ocorrência exaustiva traz prejuízos ao meio ambiente, como empobrecimento do solo, redução da biodiversidade, emissão de gases poluente no ar etc. justificando-se assim a relevância do monitoramento e controle da ocorrência de queimadas (PIROMAL et al, 2008).

O Estado de Mato Grosso, devido à sua condição geográfica, fatores climáticos e práticas agropecuárias adotadas, frequentemente está entre os estados com o maior número de queimadas. De acordo com o Sumário Executivo do SEEG / Observatório do Clima “Análise das emissões de Gases de Efeito Estufa e suas implicações para a metas climáticas do Brasil 1970-2021”, Mato Grosso é o segundo maior emissor de gases de efeito estufa per capita. Em 2021, os Estados do Pará (18,5% do total) e Mato Grosso (11,1%) aparecem como os principais emissores brutos, seguidos de Minas Gerais (6,9%), São Paulo (6,5%) e Amazonas (5,7%). A devastação dos biomas novamente é a responsável por elevar esse patamar. Alguns estados amazônicos, notadamente Roraima e Mato Grosso, emitem por pessoa duas vezes mais do que os habitantes do Qatar, um dos países com maiores emissões per capita do mundo. (SEEG, 2023¹).

O clima predominante no Estado é o clima tropical com inverno seco, de acordo com a classificação de Köppen (Figura 1). Este clima se caracteriza por apresentar uma estação chuvosa no verão, de novembro a abril, e nítida estação seca no inverno, de maio a outubro (julho é o mês mais seco). A temperatura média do mês mais frio é superior a 18º C. As precipitações são superiores a 750 mm anuais, atingindo 1800 mm (EMBRAPA, s.d).

¹ Disponível em: <https://seeg.eco.br/wp-content/uploads/2023/03/SEEG-10-anos-v4.pdf>. Acesso em 15/05/2025.



Figura 01 - Tipos climáticos de Mato Grosso (Köppen).

O clima do Estado de Mato Grosso sofre a influência de fenômenos climáticos como o El Niño, e de sistemas meteorológicos como a Zona de Convergência do Atlântico Sul e a Zona de Convergência Intertropical. Além desses sistemas, as massas de ar influenciam de forma substancial o clima do Estado.

Dessa forma, o Estado do Mato Grosso apresenta uma variedade de climas que sofrem influência dos fatores citados. Além da presença predominante do Clima Tropical com Inverno Seco, temos no Estado a presença de uma extensa faixa sob a influência do Clima Tropical Úmido ou Subúmido, principalmente na porção norte do Estado.

Este tipo de clima apresenta como características o fato de ser considerado uma transição entre os climas tropical úmido, ou superúmido, e o tropical com inverno seco. O clima tropical úmido, ou subúmido, caracteriza-se por apresentar temperatura média do mês mais frio sempre superior a 18°C apresentando uma estação seca de pequena duração que é compensada pelos totais elevados de precipitação (EMBRAPA, 2022).

No período mais seco, principalmente de julho a outubro, é quando ocorrem as queimadas com maior frequência e intensidade. O gráfico 01 demonstra a ocorrência mensal de focos de calor entre 1998 e maio de 2025².

² Disponível em https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas/situacao-atual/estatisticas/estatisticas_estados/. Acesso 13/05/2025




Gráfico 01 - Comparação do total de focos ativos detectados pelo satélite de referência em cada mês, no período de 1998 a maio de 2025. (Fonte: INPE, 2025)

Com a facilidade de acesso a um número cada vez maior de informações provenientes do Sensoriamento Remoto, a utilização de novos sensores, com melhores resoluções espacial, temporal e espectral, tem se mostrado extremamente importante para um melhor entendimento dos processos ecológicos e antrópicos que agem nos sistemas terrestres. Consequentemente, segundo Piromal (2010) as técnicas de sensoriamento remoto são muito utilizadas na detecção e monitoramento de queimadas, levando em consideração a sua eficiência na disponibilidade dos dados sobre sua localização e extensão, servindo de suporte as análises espaciais e de impactos socioeconômicos.

Nesse contexto, a utilização de ferramentas que propiciem a análise espacial e o padrão de ocorrência de queimadas em escalas diferenciadas, torna-se de relevante interesse para tomada de decisão pelos órgãos ambientais, servindo de base para a definição de políticas de educação ambiental e de comando e controle visando a manutenção da qualidade ambiental.

Um dos insumos utilizados como ferramenta para a análise espacial e o padrão de ocorrência de queimadas, são os registros de focos de calor gerados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), que são disponibilizados para consulta e *download* no site da instituição.

Atualmente o Programa Queimadas do INPE apresenta uma plataforma de acesso aos dados que permite gerar relatórios dos focos de calor, e acessar os focos e áreas queimadas de forma dinâmica, permitindo obter diversas informações relativas ao tema de forma ágil.

O Banco de Dados de Queimadas - BDQ³, permite de modo interativo a realização de análises espaciais e temporais de focos de queimadas e incêndios florestais detectados operacionalmente sobre a América Latina, atualizados a cada três horas. A figura 2 ilustra a interface da plataforma de do Bando de Dados de Queimada.




Figura 2 – Focos de calor no Estado de Mato Grosso em 13/05/2025.

Ainda, o Estado de Mato Grosso possui uma plataforma de geração de alertas de cicatrizes de queima obtidos através de processamento das imagens da constelação PlanetScope. As imagens Planet, são adquiridas por meio de constelação de satélites em operação e calibrados, com 4 bandas multiespectrais, com resolução radiométrica de 12 bits, ortorretificadas com 3 metros de resolução espacial, o que permite obter imagens atuais de grandes áreas com alto padrão de qualidade e precisão planimétrica.

A capacidade de recobrimento de toda a área do estado várias vezes ao longo da semana, com o mesmo tipo de sensor permite o monitoramento detalhado da dinâmica relacionada ao processo de alteração de vegetação nativa, além de garantir coberturas completas com baixos índices de cobertura de nuvem.

O algoritmo utilizado especifica um ID para cada alerta gerado, associando ao alerta o ID da respectiva imagem e a data da ocorrência. Isso assegura que cada alerta disponibilizado pela Plataforma seja claro e plenamente auditável quanto à data de sua ocorrência, extensão e localização, comprovando de forma objetiva e precisa a credibilidade do processo, resguardando a integridade das informações e imagens que deram origem aos alertas.

³Banco de Dados de Queimadas. Disponível em: <http://www.inpe.br/queimadas/bdqueimadas/#>. Acesso em: 13/05/2025.

Os alertas são disponibilizados semanalmente, através de processos automatizados utilizando imagens diárias selecionadas, de forma que se tenha a maior cobertura de área útil sem nuvens. Os alertas ainda são disponibilizados através de uma Plataforma WEB⁴ (figura 03).




Figura 3 – Alertas de cicatrizes de queima no Estado de Mato Grosso em entre 06/04/2025 e 05/05/2025.

Essa plataforma permite que diferentes limites administrativos (municípios, biomas, unidades regionais) sejam monitorados com a tecnologia apresentada nesta proposta e possa ter os resultados consolidados em diferentes períodos diretamente por meio da Plataforma Web o que potencializam o suporte e otimização da fiscalização de campo.

OBJETIVO

O presente relatório apresenta o levantamento dos focos de calor e cicatrizes de queima⁵, detectados no território do Estado de Mato Grosso no período entre 01/01/2023 a 31/12/2023, e tem os seguintes objetivos específicos:

- Apresentar a distribuição dos focos de calor e área queimada nas seguintes categorias: municípios, biomas, e categorias fundiárias;
- Entre as categorias fundiárias, apresentar a distribuição dos focos de calor e área queimada nas seguintes sub-categorias: Terras Indígenas, Unidades de Conservação e Projetos de Assentamento da Reforma Agrária;
- Cruzar os dados de focos de calor com os dados de alertas de desmatamento e alertas de áreas queimadas;

⁴ Disponível em <https://alertas.sccon.com.br/matogrosso/#/dashboard>. Acesso em 13/05/2025

⁵ Alertas do ano de 2023, disponibilizados até o dia 15/04/2025.

- iv. Cruzar os dados de alertas de áreas queimadas com o dado de vegetação nativa remanescente (Projeto MapBiomas⁶) para o ano de 2023.

METODOLOGIA

O Estado de Mato Grosso possui um extenso território de 903.357,91 km² (IBGE, 2009), abrangendo três biomas, pantanal, cerrado e amazônico, o que faz o sensoriamento remoto a principal forma de monitoramento da cobertura vegetal nativa e detecção de focos de calor.

O princípio físico da detecção de queimadas baseia-se na energia emitida por determinado material em chamas, principalmente na faixa termal-média de 3,7um a 4.1um do espectro ótico. Utilizam-se as imagens que tenham esta faixa característica e nelas selecionam-se os pixels com maior temperatura, em geral saturando o sensor. Esses pontos representam os pixels, que foram identificados pelo sistema de monitoramento de queimadas, com temperaturas de brilho superiores ou iguais a 320ºK, aproximadamente 47ºC, podendo não corresponder necessariamente a um incêndio.

Os dados de focos de calor são produzidos pelo INPE dos satélites que possuem sensores óticos operando na faixa termal-média de 4um e que o INPE recebe. São processadas operacionalmente as imagens AVHRR/3 dos satélites polares NOAA-15, NOAA-18, NOAA-19 e METOP-B, as MODIS dos NASA TERRA e AQUA, as VIIRS do NPP-Suomi e as imagens dos satélites geoestacionários, GOES-13 e MSG-3. Cada satélite de órbita polar produz pelo menos dois conjuntos de imagens por dia, e os geoestacionários geram várias imagens por hora, sendo que no total o INPE processa mais de 200 imagens por dia especificamente para detectar focos de queima da vegetação.

O satélite cujos dados diários de focos detectados, são usados para compor a série temporal ao longo dos anos e assim permitir a análise de tendências nos números de focos para mesmas regiões e entre regiões, em períodos de interesse, é denominado Satélite de Referência. Atualmente o satélite de referência utilizado pelo INPE é o AQUA_M-T (sensor MODIS, passagem no início da tarde).

Mesmo indicando uma fração do número real de focos (de queimadas e incêndios florestais), por usarem o mesmo método e o mesmo horário de imageamento ao longo dos anos, os resultados do "satélite de referência" permitem analisar as tendências espaciais e temporais dos focos.

Para os satélites de órbita polar (NOAAs a 800 km de distância, e TERRA e AQUA a 730 km), trabalhos de validação de campo indicam que uma frente de fogo com cerca de 30 m de extensão por 1 m de largura, ou maior, será detectada. Para os geoestacionários, a 25 mil km de distância, a frente precisa ter o dobro de tamanho para ser localizada.

A relação foco/queimada não é direta nas imagens de satélite. Um foco indica a existência de fogo em um elemento de resolução da imagem (pixel) que tem 1 km² (1 km x 1

⁶ Disponível em <https://brasil.mapbiomas.org/colecoes-mapbiomas/>. Acesso 13/05/2025.

km) ou mais. Dessa forma, uma queimada de algumas dezenas de metros quadrados será identificada como tendo pelo menos 1 km². Nas imagens dos satélites geoestacionários, onde o pixel tem 4 km x 4 km, esta pequena queimada passará a ser indicada por uma área de 16km². De maneira inversa, em uma queimada muito extensa que ocupa vários pixels, haverá a quantificação de vários focos. Ainda, é comum uma mesma queimada ser detectada por vários satélites.

Portanto, os mapas e tabelas que apresentam todos os focos de todos os satélites sempre terão algumas repetições. Adicionalmente, em muitos casos, pela variação natural do tamanho dos pixels entre os vários satélites, uma mesma queimada poderá ser indicada em locais com distância de alguns km conforme o satélite que a detectou. (INPE, 2018). Isto posto, a fim de evitar a redundância nos registros de focos de calor, os dados utilizados no presente relatório foram obtidos apenas dos registros do satélite de referência AQUA.

Trabalhos de validação indicam que o erro, na média, é de aproximadamente 400 m, com desvio padrão em torno de 3 km. Cerca de 80% dos focos estão em um raio de 1 km das coordenadas indicadas, entretanto, ao considerar o erro, podem chegar a 6 km. Esta limitação tecnológica implica no fato que nem todas as queimadas são detectadas e registradas, no entanto, isto não significa que os incêndios não tenham ocorrido e não possam se detectados e quantificados através de imagens de outros satélites ou diretamente pelo fiscal no campo.

Algumas condições podem dificultar ou impedir a detecção de queimadas, como: frentes de fogo com menos de 30 metros de extensão; fogo restrito ao solo de florestas densas, sem atingir as copas das árvores; presença de nuvens sobre a região; queimadas de curta duração que ocorrem entre as passagens dos satélites; ou fogo em encostas de montanhas não visíveis na órbita observada pelo satélite (INPE, 2023).

Os focos de calor são usados como um importante indicativo temporal e espacial da ocorrência de uma queimada. Um local com um aglomerado de focos de calor (nuvem de pontos) tem uma maior probabilidade de ser o local de ocorrência de uma queimada. Contudo, deve-se levar em consideração a variação da localização dos focos em função do sistema utilizado.

Como exposto, a relação foco versus área queimada não é direta nas imagens de satélite, no entanto são plenamente utilizadas para identificar a localização aproximada dos focos e a data das ocorrências. Esta análise pode ser subsidiada pela quantificação das áreas queimadas através da identificação por imagens de satélite de melhor resolução espacial das datas identificada pelos focos de calor.

Nesse contexto, a geração e a quantificação de alertas de cicatrizes de queimada tornam-se um importante complemento à detecção de focos de calor na análise da degradação causada pelo fogo. Para atender a essa demanda, o Estado de Mato Grosso implementou, por meio de contratação, uma plataforma voltada à geração de alertas de desmatamento, degradação e cicatrizes de queimada, com base em imagens do satélite Planet, que possui resolução espacial de 3 metros.

A metodologia utilizada, de propriedade intelectual da empresa SCCON, emprega técnicas de analytics e algoritmos aplicados às imagens diárias de alta resolução do Planet, além de um banco de dados e um fluxo de trabalho específico, desenvolvido conforme as exigências técnicas de cada tipo de detecção de mudança. A classe "Cicatriz de Queimada" refere-se à supressão parcial ou ao dano à vegetação provocado por eventos de queimada, sejam eles naturais ou antrópicos. As alterações detectadas modificam as características da vegetação, mas não a descaracterizam completamente, permitindo sua regeneração natural ao longo do tempo. Os alertas dessa classe são caracterizados por mudanças simultâneas de cor e forma na área afetada, observadas entre diferentes imagens. Eles incluem tanto áreas que ainda contêm restos de vegetação morta sobre o solo quanto regiões com solo exposto que apresentam indícios de queimada.

A figura de 4 ilustra a relação entre a identificação de focos de calor na plataforma do banco de queimadas do INPE e a resposta na imagem de satélite PlanetScope utilizada para geração do alerta da SEMA (Planet/SCCON):




Figura 04 - Exemplo da relação de imagens orbitais e focos de calor.

ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DOS FOCOS DE CALOR E CICATRIZES DE QUEIMA

Tendo como base os dados da série temporal de focos de calor do INPE no ano de 2023 (Gráfico 2) Mato Grosso, com **21.723 focos**, foi o segundo estado do Brasil com maior número de focos de calor, atrás apenas do estado do Pará, onde foram quantificados 41.715 focos.




Gráfico 02 – Distribuição dos focos de calor nas unidades federativas do Brasil no ano de 2023 (Fonte: INPE, 2025)

Com relação à área de cicatriz de queima, o sistema de alertas Planet/SCCON identificou **21.977,90 km²** de área queimada. O cruzamento destes dados com a área autorizada para realização de queima controlada (AQC's) indicou que apenas 60 hectares desta área estavam em áreas autorizadas. Desta forma, 99,997% da área queimada no estado no ano de 2023 ocorreu sem autorização.

Distribuição dos Focos de Calor e Área queimada por Município

Ao observar a distribuição espacial dos focos de calor podemos identificar determinados padrões de adensamento de focos de calor ou “zonas quentes”. Em 2023 as zonas com densidades críticas de focos de calor ocorreram principalmente no sul do Estado, com destaque para a região do município de Poconé. No noroeste do Estado, na região dos municípios de Colniza e Aripuanã, e no norte e médio norte, região dos municípios de Feliz Natal e Nova Maringá, ocorreram densidades muito altas de focos de calor (figura 5).

Ao padronizarmos o número de focos de calor do município por 100 km², temos que no ano de 2023 que Poconé, Várzea Grande e Barão de Melgaço, na região Sul foram os municípios mais críticos, com maior número de focos por 100 km² (13,79; 8,00 e 7,03 focos/100 km², respectivamente). No norte e médio norte, Nova Maringá, União do Sul e Feliz Natal (8,00; 6,71 e 6,27 focos/100 km², respectivamente) e na região leste o município de Nova Nazaré, com 5,8 focos/100 km² (figura 6).




Figura 05 - Mapa estimador de densidade Kernel para os focos de calor de 2023.





Figura 06 - Mapa de densidade de focos de calor do município/100 km², no ano de 2023.

O município de Poconé apresentou 2.372 focos de calor no ano de 2023, seguido pelo município de Colniza, com 1.337 focos e por Nova Maringá, com 923 focos (gráfico 3).




Gráfico 03 - Vinte municípios do Mato Grosso com maiores registros de focos de calor no ano de 2023 (Fonte: INPE, 2025)

Em termo de área queimada, o município de Poconé também aparece liderando o ranking, com 3.399,3 km², contudo foi seguido por Barão de Melgaço, com 1.411,06 km² e Cocalinho, com 1.228,98 km² (gráfico 4)






Gráfico 04 - Vinte municípios do Mato Grosso com maiores áreas queimadas (km²) no ano de 2023 (Fonte: INPE, 2025)

Ao padronizarmos a área queimada do município por 100 km², obtemos uma relação que demonstra melhor a importância da área queimada para cada município. Nesta análise, Luciara, no nordeste do Estado foi o município com maior área queimada em relação à sua área total (27,10 km²/100km²), seguida por Nova Nazaré (25,98 km²/U.A.) e Poconé (19,76 km²/U.A.) (Figura 7).



Projeção: Lambert Conformal Conic
Datum: Sirgas 2000

Fonte: Alertas de cicatriz de queimadas. SEMA/Planet/SCCON
Satélite de Referência: PlanetScope



Legenda

Densidade (Área queimada/100km²)





Figura 07 - Mapa de densidade de área queimada do município (km^2)/100 km^2 , no ano de 2023.

Ao comparar a distribuição das densidades de focos de calor com a de área queimada, nota-se que em que pese as regiões sul e meio norte do estado apresentarem uma importância maior de focos de calor/100 km^2 , a região leste do estado foi a que apresentou as maiores áreas queimada/100 km^2 , indicando que relativamente poucos focos de calor foram responsáveis por degradar grandes áreas nesta região. Contudo deve-se considerar também a possibilidade de erro na detecção de cicatrizes de queima em áreas de floresta (tipologia vegetal predominante no norte, meio norte e noroeste do estado), em virtude do dossel prejudicar a resposta espectral da área queimada.

Distribuição dos Focos de Calor e Área queimada por Bioma

Na análise por Biomas, o Bioma Amazônia teve o maior número de focos de calor (58,78% do total) seguido pelo bioma Cerrado (23,03% do total) e Pantanal (18,20 % do total). Contudo, em termos de área queimada, o bioma Cerrado foi o que teve maior área (59,93%) seguido pelo Pantanal (27,88%) e o Bioma Amazônia tendo o menor percentual de área queimada (12,19%) (Gráfico 5).

a)



b)




Gráfico 05 - Porcentagem de focos de calor (a) e área queimada (b), por biomas de Mato Grosso, no ano de 2023.

Distribuição dos Focos de Calor e Área queimada Categoria Fundiária

A distribuição dos focos de calor nas categorias fundiárias ocorreu da seguinte forma: 66,25% dos focos registrados ocorreram dentro das geometrias das propriedades cadastradas

na base do SIMCAR, 10,24% em Terras Indígenas (TIs), 4,43% em Assentamentos da Reforma Agrária, 6% em Unidades de Conservação (UCs), e 13,08% em áreas não cadastradas. Em territórios quilombolas foram registrados 16 focos, que representa apenas 0,07% do total de focos, (Gráfico 06).




Gráfico 06 - Distribuição dos focos de calor por categoria fundiária, no ano de 2023.

Com relação à área queimada, observou-se a seguinte distribuição: 41,96% da área queimada ocorreu dentro das geometrias das propriedades cadastradas na base do SIMCAR, 35,82% em Terras Indígenas (TIs), 2,75% em Assentamentos da Reforma Agrária, 12,72% em Unidades de Conservação (UCs), 6,69% em áreas não cadastradas. Em territórios quilombolas ocorreu apenas 0,06 % da área queimada em 2023 (Gráfico 07):




Gráfico 07 - Distribuição da área queimada por categoria fundiária, no ano de 2023.

Distribuição dos Focos de Calor e Área Queimada em Terras indígenas

Nas terras indígenas a que apresentou a maior ocorrência de focos de calor foi a TI Parabubure (262 focos), seguido da TI Pimentel Barbosa (251 focos) e a TI Paresi (230 focos). O Gráfico 08 elenca as dez Terras Indígenas com maior número de focos de calor no ano de 2023.




Gráfico 08 - Terras Indígenas com maior número de focos de calor no ano de 2023.

A Figura 8 indica a distribuição espacial das TIs com maior número de focos de calor em 2023, relacionada com o mapa de densidade de focos Kernel para aquele ano, onde é possível notar que as quatro TIs com maior número de focos coincidiram com áreas de alta e muito alta densidade de focos.





Figura 08 - Mapa estimador de densidade Kernel para focos de calor de 2023 e as 10 Terras indígenas com maior número de focos naquele ano.

A área queimada em TIs correspondeu com uma importante e preocupante porção da área queimada total do Estado em 2023: 35,82%. As três TIs com maiores áreas queimadas em 2023 foram as mesmas com maior número de focos de calor, contudo, a TI Pimentel Barbosa liderou o ranking, com 1.366,65 km² de área queimada, seguida pela TI Parabubure com 1.137,87 km² e Paresi, com 887,79 km². As 10 TIs com maiores áreas queimadas em 2023 estão ranqueadas no gráfico 9:




Gráfico 09 - Terras Indígenas com maiores áreas queimadas (km²) no ano de 2023.

Distribuição dos Focos de Calor e Área Queimada em Unidades de Conservação

Nas Unidades de Conservação que mais apresentaram registro de focos de calor no ano de 2023 foram o PARNA do Pantanal Matogrossense com 366 focos, o Parque Estadual Encontro das Águas, com 210 focos, e a R.P.P.N. Fazenda Estância Doroquê com 178 focos. O gráfico 10, apresenta as dez UCs que mais registraram focos de calor em 2023.





Gráfico 10 – Número de focos de calor em Unidades de Conservação no ano de 2023.

A Figura 9 indica a distribuição espacial das UCs com maior número de focos de calor em 2023, relacionada com o mapa de densidade de focos Kernel para aquele ano. As Ucs do Pantanal, que lideraram o ranking de focos de calor se sobrepõem a áreas com densidades de focos extremamente alta e crítica. As demais, estão sobrepostas a áreas com baixas a muito altas densidades de focos.



Projeção: Lambert Conformal Conic

Datum: Sirgas 2000

Fonte: Focos de Calor. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais-INPE

Satélite de Referência: AQUA




Figura 09 - Mapa estimador de densidade Kernel para focos de calor de 2023 e as 10 Unidades de Conservação com maior número de focos naquele ano.

Em termos de área queimada, o PARNA do Pantanal Matogrossense também foi o que liderou o ranking, com 564,27 km² de cicatriz de queima. Em segundo lugar, A APA Federal

Meandros do Rio Araguaia, com 536,09 km² e em terceiro está o Parque Estadual Encontro das Águas, com 427,28 km² de área queimada (gráfico 11).




Gráfico 11 – Unidades de conservação com maiores áreas queimadas (km²) no ano de 2023.

Distribuição dos Focos de Calor e Área Queimada em Projetos de Assentamento

Com participação de 4,43% no número de registros de focos de calor em Mato Grosso e 2,75% o total da área queimada, os assentamentos da Reforma Agrária têm uma importância significativa no volume e ocorrência de queimadas. Com relação ao número de Focos de Calor, o Projeto de Assentamento ENA com 88 focos registrados, foi o que liderou o ranking, seguido pelos PAs, Nova Cotriguaçu e Tibagi, com 79 e 57 focos, respectivamente (gráfico 12):





Gráfico 12. Número de focos de calor em Assentamento da Reforma Agrária no ano de 2023.

A Figura 10 indica a distribuição espacial dos PAs com maior número de focos de calor em 2023, relacionada com o mapa de densidade de focos Kernel para aquele ano. Nota-se que os 10 PAs com maior número de focos de calor estiveram em regiões com baixa a média densidade de focos:



Projeção: Lambert Conformal Conic

Datum: Sirgas 2000

Fonte: Focos de Calor: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais-INPE

Satélite de Referência: AQUA




Figura 10 - Mapa estimador de densidade Kernel para focos de calor de 2023 e os 10 Projetos de Assentamento da Reforma Agrária com maior número de focos naquele ano.

Com relação à área queimada em PAs, o líder do ranking foi o PA Santo Antônio da Mata Azul, com 180,81 km² de área queimada, seguido pelos PA Presidente e Macife, com 99,6 e 55,25 km² de área queimada, respectivamente (Gráfico 13):




Gráfico 13 – Projetos de assentamento com as maiores áreas queimadas (km²) no ano de 2023.

Cruzamento dos dados de focos de Calor com os alertas de desmatamento e área queimada

Ao cruzar os dados de focos de calor do INPE de calor com os alertas de desmatamento e cicatriz de queima gerados pelo sistema de Alertas da SEMA/PLANET/SCCON, separadamente, observou-se que 6,09% dos focos de calor registrados no bioma Amazônia, incidem em áreas de que foram desmatadas no mesmo período, e um número semelhante (6,73%) incide em áreas que foram somente queimadas. Em contraponto, os biomas Cerrado e Pantanal apresentaram uma porcentagem irrisória de focos que incidem sobre áreas desmatadas (2,00 e 0,13% respectivamente), e as maiores porcentagens de focos incidindo em áreas que foram somente queimadas: 36,07% e 81,38%, respectivamente (gráfico 14). Dessa forma, nota-se que neste ano que o bioma Amazônia foi o que apresentou maior associação do fogo com o desmatamento. Diferentemente, nos demais biomas, os focos estavam mais associados com a área queimada.

Aqui, mais uma vez, se faz importante a consideração da possibilidade de ocorrência de um maior erro na detecção de cicatrizes de queima em áreas de floresta, em virtude do dossel prejudicar a resposta espectral da cicatriz de queima.




Gráfico 14 – Ocorrência de focos de calor em áreas com alertas de desmatamento e queima, e a porcentagem de focos incidentes em cada um dos tipos de alertas, no ano de 2023.

Cruzamento dos dados de alertas de queimadas com os dados de vegetação nativa do Projeto MapBiomias

Para quantificar a área de degradação da vegetação nativa em decorrência do fogo, nos três biomas, foi realizado o cruzamento dos polígonos de degradação florestal mapeados pelos alertas da SSSCON (classe: cicatriz de queimada) para o ano de 2023, com a classe de vegetação nativa da Coleção 9 do projeto Mapbiomas (vegetação nativa até o ano de 2023).

De acordo com o último dado de vegetação nativa remanescente no estado de Mato Grosso, quantificado pelo projeto MapBiomias, constavam, no ano de 2023, 54.495.997,85 km² de vegetação nativa (aproximadamente 60 % da área do estado). A intersecção da área total queimada em 2023 (21.997,90 km²) com o dado do MapBiomias revelou que foram queimados 15.871,33 km² de vegetação nativa neste ano, ou seja, 72,21% da área queimada continha vegetação nativa.

No período analisado, o bioma Pantanal foi o mais impactado pela degradação da vegetação nativa, com 14% (5.900,68 km²) de sua área remanescente afetada pelo fogo. No

Cerrado, 4% (7.807,98 km²) da vegetação nativa remanescente foi atingida por queimadas, enquanto na Amazônia esse índice foi de 1% (2.162,67 km²) (gráfico 15).





Gráfico 15 – Degradação por fogo em área de vegetação nativa remanescente, por bioma, no ano de 2023.


Estes resultados corroboram com os dados de Análise de Focos de queimadas X Supressão da vegetação nativa, gerada no dashboard de queimadas do programa TerraBrasilis⁷, onde se verifica a maior associação dos focos de calor com áreas desmatadas (antigas e recentes) na amazônia do que nos demais biomas (Figura 11, 'a', 'b' e 'c'):

a)



⁷ Disponível em: <https://terrabrasilis.dpi.inpe.br/app/dashboard/fires/biomes/aggregated/>. Acesso em 15/05/2025.

b)



c)




Figura 11. Dashboard de queimadas do programa TerraBrasilis contendo a distribuição dos focos de calor do ano de 2023, em diferentes classes de cobertura do solo, nos biomas Amazônia (a) Cerrado (b) e Pantanal (c), no estado de Mato Grosso.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A degradação da vegetação nativa associada ao uso do fogo, é um dos maiores problemas relacionados à perda de cobertura florestal, impactos na biodiversidade e emissão de carbono. Ainda, a relação da ocorrência do fogo com desmatamento é direta, principalmente no bioma Amazônia onde o fogo não é natural, e dependendo da intensidade, pode afetar a estrutura florestal. De acordo com o IPAM, 2019, a floresta amazônica é um ambiente úmido, e o fogo natural acontece raríssimas vezes no bioma, a cada 500 anos ou mais. Mesmo na estação seca, quando há condições ambientais e material combustível mais favoráveis, a umidade presente na região não permitiria tantos focos de calor se não houvesse a ação humana como fonte de ignição constante.

No Ano de 2023, no Bioma amazônico foi observada a maior ocorrência de focos de calor em comparação com o cerrado e pantanal. O fogo na floresta úmida da Amazônia está relacionado com o processo de desmatamento, na qual o fogo é empregado para reduzir a biomassa para realização do desmatamento, e utilizada novamente após o desmate para eliminação dos restos da exploração.

Embora a maioria dos tipos de vegetação brasileiros queimem periodicamente, existem ecossistemas sensíveis ao fogo e dependentes do fogo. Florestas tropicais, como a Amazônia e as matas atlânticas, são sensíveis ao fogo. A maioria das espécies de florestas tropicais não tolera queimadas, e depois de alguns incêndios repetidos, árvores são mortas, a matéria orgânica do solo (que é o reservatório de nutrientes em florestas tropicais úmidas) é incinerado, a estrutura e composição florística da floresta muda, e a floresta muda para outro tipo de ecossistema: seja para uma floresta degradada ou para um ambiente de savana (BORHIDI 1988, COCHRANE *et al.* 1999, NEPSTAD *et al.* 2001, *apud* PIVELLO, 2011).

De forma simplificada, uma floresta degradada pode ser definida como uma área que permanece com tipologia florestal - ou seja, nunca sofreu corte raso, porém sofreu perda de biomassa, de biodiversidade e de serviços ecológicos importantes, resultante de eventos como queimadas, exploração predatória de madeira e fragmentação florestal (PARROTTA *et al.*, 2012).

O bioma Cerrado e as savanas abertas, por sua vez, são ecossistemas mais adaptados e dependentes do fogo. Contudo, o regime do fogo de origem natural tem sido alterado pelas atividades antrópicas ao longo dos últimos 4.000 anos, sendo agravado nas últimas décadas. Atualmente, a ignição humana é a principal causa da ocorrência de incêndios florestais; e os de origem natural são causados predominantemente pela incidência de raios (PIVELLO, 2011).

A combinação de atividades antrópicas e anos mais secos aumenta consideravelmente o número e a extensão dos incêndios florestais na Amazônia e regiões do cerrado (PIVELLO, 2011). De acordo com Oliveira *et al.*, (2022), no Cerrado e no Pantanal, o clima é o principal determinante do impacto do fogo, enquanto os fatores antrópicos prevalecem na Amazônia.

No ano de 2023 destaca-se a distribuição crítica de focos de calor e área queimada no Pantanal e a grande área queimada na região leste do Estado, na planície do rio Araguaia, bem como a importante degradação causada na vegetação nativa remanescente nos biomas Pantanal e Cerrado (da ordem de 53% e 27%, respectivamente) De acordo com o levantamento mais recente do Projeto MapBiomas (2025), o pantanal perdeu cerca de 50% de sua massa d'água nos últimos 38 anos, e a nova realidade deste Bioma são períodos de cheias cada vez menores e secas cada vez mais prolongadas, que favorecem incêndios mais intensos. Tal padrão está associado à predominância de vegetação campestre, à alta incidência de variações do regime de inundações na planície e a períodos de seca prolongados.

Na planície do Araguaia, não existem trabalhos que relacionem perda de vegetação nativa e/ou perda de área alagável com a incidência de queimadas. Contudo, Arruda *et al.* (2023) considera que a conversão de 37% da vegetação nativa para a expansão agrícola e o incentivo à drenagem para o desenvolvimento de agricultura empresarial nesta região (SEMA, 2016) como fatores preocupantes para a conservação deste ecossistema. Tais fatores alteram a composição da vegetação nativa e os pulsos de inundação, que poderão favorecer novas ocorrências de intensas queimadas na região.

A perpetuação das queimadas, nestes cenários, imporá perdas sociais e ambientais de grande monta, dada a elevação do risco de incêndios. A mitigação das consequências requer políticas públicas, as quais, de fato, têm se mostrado eficazes na contenção do desmatamento regional. O mesmo, contudo, não pode ser dito quanto às ocorrências de fogo (FONSECA-MORELLO, 2017).

As informações dispostas neste relatório subsidiam a Secretaria de Estado do Meio Ambiente no planejamento, possibilitando traçar estratégias efetivas na prevenção e combate às queimadas ilegais, orientar as equipes de fiscalização como um importante indicador de áreas críticas, também servindo de dados para confecção de materiais de sensibilização para a educação ambiental acerca das queimadas.

Outro importante papel desse insumo é servir como ferramenta de tomada de decisão das futuras políticas a serem adotadas na contenção do crescimento dos focos de calor, principalmente de queimadas ilegais, ocorridas tanto dentro como fora do período proibitivo.

REFERÊNCIAS

ANDERSON, Liana Oighenstein. Classificação e monitoramento da cobertura vegetal do estado do Mato Grosso utilizando dados multitemporais do sensor MODIS. São José dos Campos: INPE, 2005.

ARAGÃO, L. E. O. C. et al. Frequência de queimadas durante secas recentes. *Eventos Climáticos Extremos na Amazônia: causas e consequências*, v. 13, 2016.

ARAGÃO, L. E. O. C.; ANDERSON, L. O.; FONSECA, M. G. et al. 21st century drought-related fires counteract the decline of Amazon deforestation carbon emissions. *Nature Communications*, v. 9, p. 536, 2018. Disponível em: <https://doi.org/10.1038/s41467-017-02771-y>. Acesso em: 13 maio 2025.

ARRUDA, E. C.; NUNES DA CUNHA, C.; JUNK, W. J. Área alagável do rio Araguaia: classificação dos macrohabitats de uma grande área úmida savânica tropical. *Biodiversidade Brasileira*, v. 13, n. 2, p. 1-24, 2023. DOI: 10.37002/biobrasil.v13i2.2154.

COUTINHO, A. C. Dinâmica das queimadas no Estado do Mato Grosso e suas relações com as atividades antrópicas e a economia local. 2005. 308 f. Tese (Doutorado em Ciências Ambientais) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.

FONSECA-MORELLO, Thiago et al. Queimadas e incêndios florestais na Amazônia brasileira: porque as políticas públicas têm efeito limitado. *Ambiente & Sociedade*, São Paulo, v. 20, n. 4, p. 19-40, 2017.

INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Queimadas: perguntas frequentes. 2023. Disponível em: <https://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/portal/informacoes/perguntas-frequentes>. Acesso em: 13 maio 2025.

INPE – Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Banco de dados de queimadas. 2023. Disponível em: <https://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/bdqueimadas>. Acesso em: 13 maio 2025.

IPAM – Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia. Tudo o que você queria saber sobre fogo na Amazônia, mas não sabia para quem perguntar. Cartilha. 2019. Disponível em: <https://ipam.org.br/cartilhas-ipam/tudo-o-que-voce-queria-saber-sobre-fogo-na-amazonia-mas-nao-sabia-para-quem-perguntar/>. Acesso em: 13 maio 2025.

LIBONATI, R.; DaCAMARA, C. C.; PERES, L. F.; CARVALHO, L. A. S.; GARCIA, L. C. Rescue Brazil's burning Pantanal wetlands. *Nature*, v. 588, n. 7837, p. 217-219, dez. 2020. DOI: 10.1038/d41586-020-03464-1.

OLIVEIRA, U.; SOARES-FILHO, B.; BUSTAMANTE, M.; GOMES, L.; OMETTO, J. P.; RAJÃO, R. Determinants of fire impact in the Brazilian biomes. *Frontiers in Forests and Global Change*, v. 5, 2022. Disponível em: <https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/ffgc.2022.735017>. Acesso em: 24 mar. 2023. DOI: 10.3389/ffgc.2022.735017.

PARROTTA, J. A.; WILDBURGER, C.; MANSOURIAN, S. (Ed.). *Understanding relationships between biodiversity, carbon, forests and people: the key to achieving REDD+ objectives*. Vienna: International Union of Forest Research Organizations, 2012. 161 p. (IUFRO World Series, v. 31).

PIROMAL, A. S. et al. Utilização de dados MODIS para a detecção de queimadas na Amazônia. *Acta Amazonica*, v. 38, p. 77-84, 2008. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/aa/v38n1/v38n1a09.pdf>. Acesso em: 15 abr. 2010.

PIVELLO, V. R. The use of fire in the Cerrado and Amazonian rainforests of Brazil: past and present. *Fire Ecology*, v. 7, n. 1, 2011. DOI: 10.4996/fireecology.0701024.

PROJETO MAPBIOMAS. Mapeamento anual de cobertura e uso da terra no Brasil – Coleção 9. 2025. Disponível em: <https://brasil.mapbiomas.org/2024/11/12/reducao-de-superficie-de-agua-no-pantanal-favorece-incendios/>. Acesso em: 13 maio 2025.

SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Resolução SMA nº 81, de 18 de agosto de 2017.

SEEG – Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa. Análise das emissões de gases de efeito estufa e suas implicações para as metas climáticas do Brasil: 1970-2021: sumário executivo. São Paulo: Observatório do Clima, 2023.

SEMA/MT – Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso. Áreas úmidas do Estado de Mato Grosso: relatório técnico. Cuiabá: CCRE/SEMA, 2016.

SILVA, A. S.; SILVA, M. C. Prática de queimadas e as implicações sociais e ambientais na cidade de Araguaína-TO. *Caminhos da Geografia*, Uberlândia, n. 7, p. 8-16, 2006.